



# ABSCESO EN HÍGADO DE CORDERO



## COMENTARIO DEL S.V.O.

Se remiten unas fotos de un hígado de un cordero, aprox. 3-4 meses de edad.

Aunque en las fotos pueda parecer que tiene tránsitos de parásitos, solo presenta una única lesión, un quiste/absceso (el resto son artefactos de la luz en la foto). No hay otras lesiones en otros órganos ni ganglios. Ni este animal ni otro en el lote presenta otros procesos parasitarios. No nos ponemos de acuerdo si podría ser tuberculosis (el aspecto y textura es muy similar, caseosa), un simple absceso, o un quiste parasitario (hidatídico o cisticerco) consolidado e inflamado, pero dada la escasa edad del animal esto último nos despista.

El aspecto es de un absceso, ya que parece que tiene una cápsula fibrosa blanca delimitando la lesión, pero el contenido si parece caseoso. No cuadra con la tuberculosis la cavidad quística central y la cápsula fibrosa en banda alrededor. Podría ser una lesión parasitaria degenerada o, más probablemente por la edad tan joven, un absceso con llegada de gérmenes piógenos vía biliar, desde una enteritis o colecistitis. La tuberculosis hepática en un animal tan joven sería de los ganglios portales (adenopatía satélite) con complejo primario en la placenta materna. En mi opinión el decomiso del hígado sería suficiente.

Ana Bravo Moral  
Dpto. Anatomía Patológica – Facultad de Veterinaria