XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE SANIDADE
Dirección Xeral de Saúde Pública

ATROFIA DE MÉDULA ESPINAL





COMENTARIO DEL S.V.O.

Tenreiro de 7 meses que presenta dificultade para manterse en pé e pasa moito tempo deitado. Na inspección antemortem non se observan alteracións neurolóxicas, nin febre e o propietario afirma que non sufrio ningún traumatismo. Na inspección postmortem compróbase unha atrofia da médula espinal pola presión dun absceso de pus subvertebral que se infiltra polo disco ata a médula.

Atrofia de médula espinal

Vexo un absceso dorsal á 2ª vértebra cervical que abriuse e drenou o pus no espazo intervertebral (entre o atlas e o axis) que aparece dilatado e con pus; o pus saiu pola gravedad pola parte ventral do espazo intervertebral, pero está rodeado dunha cápsula vascularizada, de cor vermella, que presiona e provoca a atrofia medular como ben dis ti a nivel de C2, pero sen diseminar o pus ao canal medular; produciu entón unha atrofia medular "aséptica". Foi collida moi a tempo, porque é posible que o pus acabara drenando na cavidade medular e producindo meninxite. O absceso dorsal cervical pode producirse por calquera traumatismo, inxección, etc, contaminado con pióxenos.
Moi boas fotos Paco!

Ana Bravo Moral
Dpto. Anatomía Patológica – Facultad de Veterinaria